

Бешенство мелкого рогатого скота.

Острое вирусное заболевание, которое протекает с тяжелым поражением нервной системы, заканчивается всегда смертельным исходом. Болеют все сельскохозяйственные и домашние животные, дикие животные, а также люди. Болезнь вызывает вирус. Источник инфекции – больные животные, выделяющие вирус со слюной и передающие его через укус. В слюне вирус диагностируется за 8-10 суток до появления клинических симптомов заболевания, инкубационный период болезни составляет от нескольких суток до 6 месяцев, в среднем 3-6 недель. Вирус из места укуса распространяется по нервным стволам к головному и спинному мозгу, поражает нервные клетки, чем и обуславливает проявления болезни.

Клинические признаки (симптомы). У мелкого рогатого скота чаще наблюдается тихая форма бешенства, выражающаяся в хриплом блеянии, слюнотечении, шаткости походки, извращении аппетита, развитии на вторые сутки паралича конечностей. (рис. 3).



Диагноз «бешенство» ставят на основе характерных эпизоотологических (распространение заболевания) и клинических признаков болезни, а также при его подтверждении путем проведения специальных лабораторных исследований.

Лечение неэффективно. Больное животное следует изолировать и немедленно вызвать специалиста в области ветеринарии.

Профилактика основана на вакцинации собак, кошек против бешенства, а также оральной иммунизации против бешенства диких плотоядных животных.

Бешенство животных регистрируется на всей территории Самарской области, регион стационарно неблагополучен по бешенству